

第三、夜間視力増強ニ関スル研究

本研究ハ次ノ二項目ヨリナル

(1) 藥物ニ依ル光神ノ増強

(2) 周辺視ニ依ル夜間視法

本藥物ニ依ル光神ノ増強

始メ夜盲症ノ治療ニ肝油ノ單拔ナル効力アルコトニ著眼シ

大量ノ肝油ヲ健康者ニ如何ニテ多量吸收セシムヘキヤノ

研究ニ繫ス

先ツ無水素コージル酸ヲナトリウムト肝油トヲ併用スルコトニ依リ

光神ノ著明ナル増強ヲ認メタルモ物質的ニ大量製産

不可能ナルニ依リ之カ代用トナルギモノヲ探求シ

*Longa*ノ球根カ *dehydrocholine*ト同様ノ効力アルコト

0099

ヲ察見シ之ト所由ヲ合シ夜間視力増強剤ヲ製シタリ

且、周辺視ニ依ル夜間視法

人体ノ網膜中心(黄斑部)ハ晝間視力ハ頗ル鋭敏ナレ共、
夜間ハ視力著シク低下シ周辺部網膜ノ方視力鋭敏ナリ
擬言スレハ視細胞ノ円錐細胞ハ晝間視力鋭敏ナレ共、夜
間ハ杆状体細胞ノ方鋭敏ナリ、故ニ夜間視法トシテ中心
ヨリ五―十度ノ点ニ於テ視ル如キ訓練法ヲ案出セリ、

以上兩研究ヲ組合セ夜間視力増強ニ資セリ

且、夜間視力増強法ニ關スル細説別冊第一ノ如シ

ハ、サテ新視法トシ

五部

升格新規格

第五部

陸軍

第一師團、内容次ノ如シ

五石國際單位、肝動 〇・〇七五 (三五〇單位)

タルロニ末 〇・〇七五

レ々々々 〇・〇〇〇三五五以上

右ノ具備ノ條件トシ之職形前トシ

硬火臘 約〇・〇二五

大豆粉 適量

グリセリン 適量

薄サ新油 〇・〇〇〇七

等々添加シテ直径約七〇センチノ丸子トナシ第三燐酸石灰

〇・〇〇〇五糖衣ノ下掛ケトス

第一師團、外觀及ヒ糖衣ノ厚サノ如シ

糖衣ノ厚サ 二〇センチ

外觀

色

淡黄色

大井及形状直径二二〇視孔

能石ノ使用法一回量三角一日三回(一日量九個)トス

0102